

大腸内視鏡検査 説明 同意書

□大腸内視鏡検査

- ・検査前に食事制限、下剤の服用があります。便が大腸に残っている場合、浣腸をする事があります。
- ・検査直前に、腸の動きを止める注射をします。これで、目がチカチカする、口が渇く事があります。鎮静剤を使用する場合には、眠気がくる、ふらつく事もあります。その後、内視鏡を肛門から挿入して検査を行います。大腸が長い方、手術歴がある方は、挿入が難しい事もあります。検査では、大腸の中に空気を送って膨らませながら観察します。当院では、おなかが張らない気体を使用していますが、それでも、ごくまれに、検査後、1時間程度、おなかが張って苦しくなる方もあります。
- ・検査中、組織検査、ポリープの切除をする事があります。ポリープの切除を行った場合には、検査当日から数日間は、激しい運動、飲酒は出来ません。1週間程度は、出血の可能性もあります。(出血した場合には夜間でも、当院で止血の処置が出来ます)

内視鏡検査による合併症

きわめて稀に、出血や穿孔（消化管に穴を開けてしまう事）などがあり、止血や、緊急手術が必要になる事もあると言われております。

検査の時に使用する薬剤や鎮静剤により、副作用がでる事もあります。これらの薬剤でショックをおこし、死亡した例もあります。

なお、当院では、開業以来、内視鏡検査による重大な事故がおこった事はありません。

内視鏡当日は、自動車、バイク、自転車の運転は絶対にしてはいけません。(当院でおこった事ではありませんが、内視鏡検査後、自分で車を運転して帰宅途中、事故をおこして亡くなった方があります)

同意を検査前に拒否、撤回されても構いません。

該当する場合には下記にチェックを入れて下さい。(胃で記入された方は不要です)

□心臓病（狭心症、弁膜症、不整脈） □高血圧 □腎臓病 □脳梗塞 □血液疾患

□緑内障 □前立腺肥大症 □薬のアレルギー（薬剤名： ）

□糖尿病（薬剤 □無し □有り 薬剤名 ）

【血を固まりにくくする薬の内服】□無し □有り（薬剤名： ）

女性の方 妊娠または妊娠の可能性 □無し □有り

授乳 □無し □有り

上記記載事項を理解、承諾し、検査に同意します。

平成 年 月 日

氏名 _____